

湘机 677 号

湖南省直机关发电

发电单位 中共湖南省直属机关工作委员会 签批盖章 龚凤祥

等级特急·明电 湘直通〔2020〕3号

中共湖南省直属机关工作委员会 关于印发《机关单位疫情防控措施》的通知

省直机关和中央驻长各单位：

为进一步做好机关单位疫情防控工作，根据部署要求，现将《机关单位疫情防控措施》印发给你们，请认真执行落实。

中共湖南省直属机关工作委员会

2020年2月5日

机关单位疫情防控措施

为防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散传播，特就机关单位科学防控疫病提出如下措施。

一、落实主体责任

各机关单位主要领导对本部门本单位的疫情防控负总责，成立疫情防控工作专班，制定疫情防控工作方案，层层落实疫情防控工作责任。要认真开展干部职工健康状况筛查和日常体温检测，筛查结果和检测结果实行“日报告”和“零报告”制度，省直机关各单位的结果于每天 17 时前报送省直机关工委，严禁迟报、漏报、误报、错报。

二、全面排查返岗人员健康状况

各机关单位要在人员返岗前详细了解和掌握干部职工的健康状况、节假日期间出行和参加集会聚会等情况，排查干部职工是否来自疫情重点地区，近两周是否去过疫情重点地区，是否与来自疫情重点地区人员或新型冠状病毒感染的肺炎病人有过密切接触，是否有发热、咳嗽等症状，确保全员覆盖、不漏一人。经干部职工本人承诺确认后登记造册，进行台账式管理。严格个人事项报告制度，对有前述任一情况的干部职工，应该主动报告自身情况，并自行居家隔离 15 天或医学观察 15 天，待观察期满排除感染可能方可返岗上班。对目前在湖北等重点地区的工人

员，除非确有必要，经申请同意方可返回工作单位。

三、认真落实工作场所防控措施

(一) 加强进出人员管理。新型冠状病毒感染的肺炎流行期间，各单位应当加强对干部职工和来访人员的健康监测和登记等工作。门岗应设置体温检测点和隔离区，每个进入人员均须接受体温检测，体温异常者引导入隔离区接受隔离观察。外来人员应同时进行有关信息登记。

(二) 开展办公场所消毒。

1. 公共区域和公用物品消毒

(1) 办公室和会议室。首选自然通风，开门开窗保持空气对流，每天2次以上，每次30分钟以上；不能自然通风的，可采用机械排风。出现疑似病例时，应进行终末消毒，方法是用3%的过氧化氢消毒液和0.5%过氧乙酸消毒液喷雾消毒，密闭作用30分钟后，开门开窗通风。

(2) 电梯。在无人和密闭环境中，采用3%的过氧化氢喷雾对电梯间内空气和表面进行消毒，使用剂量 $20\text{ml}/\text{m}^3$ ，空气作用和表面消毒时间30分钟。同时用3%的过氧化氢对电梯间开关、按钮进行擦拭消毒。电梯消毒频率为每天2~4次。

(3) 地面。机关大厅地面和每楼层公共走廊等用50mg/L~500mg/L的含氯消毒剂进行喷洒或湿式拖地。地面消毒频率为每天1~2次。

(4) 高频接触物体。每天对高频接触物体（开关、按钮、

扶手、门把手、水龙头、桌面等)表面进行清洁消毒,用含乙醇消毒液进行擦拭消毒,也可采用消毒湿巾进行擦拭消毒,或者用有效氯 500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭,同时做好清洁消毒记录。高频接触物体消毒频率为每天2~4次。

(5)卫生洁具。卫生洁具可用有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂浸泡或擦拭消毒,作用30分钟后,清水冲洗干净,晾干待用。卫生洁具消毒频率为每天2~4次。

2. 手消毒

电梯门口应放置速干手消毒剂,方便电梯进出人员进行卫生手消毒。盥洗室内洗手设施运行正常,配备速干手消毒剂,有条件时可配备感应式手消毒设施。

3. 垃圾处理

加强垃圾的分类处理,及时收集并清运。垃圾桶等垃圾盛装容器定期消毒,可用含有效氯 $800\sim 1000\text{mg/L}$ 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭,或者采用消毒湿巾进行擦拭,消毒频率为每天2~4次。

(三)避免人群集中。机关单位要尽量不开会,如确有必要,可采取召开电视电话会议形式。不集中在食堂用餐,干部职工就餐可采用分餐、轮流用餐或打盒饭回办公室用餐等形式。尽量不举行聚集性活动。

四、做好食堂就餐安全管理

各机关单位要严格落实食堂从业人员持健康证明上岗制度,

做好食堂从业人员的健康体检和每日早晨的体温检测。食堂进货严格落实索证索票，不使用野生动物，不使用来源不明的家禽家畜。餐（饮）具去残渣、清洗后，煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟，也可采用红外线消毒柜进行消毒，或者采用有效氯含量为 250mg/L 溶液浸泡消毒 30 分钟，消毒后应将残留消毒剂冲洗干净。

五、加强个人防护

工作人员进出办公场所，须正确佩戴口罩。要勤洗手。有肉眼可见污染物时，应用洗手液在流动水下洗手；无肉眼可见污染物时，可使用速干手消毒剂进行手消毒。尽量减少接触公共场所的公共物品和部位，从公共场所返回、咳嗽手捂之后、饭前便后，用洗手液或香皂在流动水下洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼；打喷嚏或咳嗽时，用手肘衣服遮住口鼻。减少与他人接触，以点头礼或拱手礼取代握手，条件允许时，尽量与他人保持一定距离。在岗期间注意身体状况的变化，当出现发热、咳嗽等症状时，应佩戴医用预防口罩或 N95 口罩及时按规定去定点医院就医，尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具；对污染的场所和物品进行彻底消毒。

